

<b>DRE – SAVANES</b> <b>Année scolaire</b> <b>2022 – 2023</b>	<b>Compositon Régionale</b> <b>du Premier Semestre</b> <b>Epreuve de mathématiques</b>	<b>Classe : 1<sup>ère</sup> C<sub>4</sub></b>
		<b>Durée : 04 heures</b> <b>Coéfficient: 05</b>

### **Exercice :1 (03,75 points)**

L'unité de longueur est le *cm*. Soit  $ABC$  un triangle isocèle en  $A$  tel que :  $AB = AC = 5$  ;  
 $BC = 6$  et  $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 3), (C; 3)\}$ .

1. a. Faire une figure. (0,25 pt)
- b. Utiliser la propriété d'Alkashi pour déterminer  $\cos(\widehat{AB, AC})$ . (0,25 pt)
- c. En déduire le produit scalaire  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ . (0,25 pt)
- d. Soit  $I$  le milieu du segment  $[BC]$ .  
Ecrire  $G$  comme barycentre des points  $A$  et  $I$  et en déduire que  $AG = 3$ . (0,5 pt)
2. Soit  $f$  une application du plan dans lui-même qui à tout point  $M$  associe  
$$f(M) = 2\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$$
  - a. Calculer  $f(A)$ . (0,5 pt)
  - b. Montrer que :  $f(M) = 4MG^2 + f(G)$ . (0,75 pt)
3. Soit  $(\gamma)$  l'ensemble des points  $M$  du plan tels que :  $f(M) = f(A)$ .
  - a. Déterminer en discutant suivant les valeurs de  $f(G)$  la nature de  $(\gamma)$ . (0,75 pt)
  - b. Représenter  $(\gamma)$  sur la figure précédente sachant que  $f(G) = 5$ . (0,5 pt)

### **Exercice :2 (04,5 points)**

1. Vérifier que les égalités :  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$  et  $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$  sont les équations cartésiennes de deux cercles  $(C)$  et  $(C')$  dont on précisera les éléments caractéristiques. (1 pt)
2. Démontrer que  $(C)$  et  $(C')$  sont sécants en deux points  $A$  et  $B$  dont on précisera les coordonnées. (0,75 pt)
3. Vérifier que le point  $H(3; 1)$  appartient à  $(C)$  puis écrire une équation cartésienne de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  en  $H$ . (0,5 pt)
4. Démontrer que  $(C')$  et  $(T)$  sont sécants puis déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection  $E$  et  $F$ . (1 pt)
5. Déterminer une représentation paramétrique de la tangente  $(T)$ . (0,5 pt)
6. Soit  $k$  un réel, on admet que l'équation  $x^2 + y^2 - 2kx - 4ky + 10(k - 1) = 0$  est l'équation d'un cercle  $(C_k)$ .  
Démontrer que pour tout nombre réel  $x$  ;  $(C_k)$  passe par deux points fixes  $I$  et  $J$  dont on précisera les coordonnées. (0,75 pt)

### **Exercice :3(03,25 points)**

Soit  $G$  un point tel que  $G = \text{bar}\left\{\left(A; \sqrt{5 - \sqrt{5}} \cos 3x\right), \left(B; \sqrt{3 + \sqrt{5}} \sin 3x\right), \left(C; -\sqrt{2}\right)\right\}$ .

On suppose que  $x \in [0; 2\pi]$ . On donne  $\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) = \frac{1-\sqrt{5}}{4}$ .

1. Calculer  $\cos^2\left(\frac{3\pi}{10}\right)$  ;  $\sin^2\left(\frac{3\pi}{10}\right)$  et en déduire les valeurs exactes de  $\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)$  et  $\sin\left(\frac{3\pi}{10}\right)$ . (1 pt)
2. On pose  $A(x) = \sqrt{5 - \sqrt{5}} \cos 3x + \sqrt{3 + \sqrt{5}} \sin 3x$ .

- a. Détermine deux réels  $a$  et  $b$  tels que :  $A(x) = a \cos(3x + b)$ . (0,5 pt)
- b. Résoudre l'équation :  $x \in [0; 2\pi], A(x) - \sqrt{2} = 0$ . (1pt)
- c. Déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $G$  existe. (0,25 pt)
3. Pour  $x = \frac{\pi}{10}$ , montrer que  $G = \text{bar}\{(A; 5 - \sqrt{5}), (B; 3 + \sqrt{5}), (C; -4)\}$ . (0,5 pt)

### **Exercice :4 (06 points)**

On considère la fonction numérique à variable  $x$  réelle définie par :

$f_m(x) = mx^2 - (2m + 1)x + 2$  où  $m$  est un paramètre réel. On désigne par  $(C_m)$  la représentation graphique de la fonction  $f_m$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a. Construire les courbes  $(C_0)$  et  $(C_1)$  dans le plan. (0,75 pt)
- b. En déduire les coordonnées des points communs à toutes les courbes  $(C_m)$ . (0,5 pt)
- c. Déterminer l'image directe de l'intervalle  $]-\infty; -1]$  et l'image réciproque de l'intervalle  $[0; 2]$  par  $f_1$ . (0,5 pt)
2. On suppose  $m \neq 0$ .  
Déterminer les coordonnées sommet  $S_m$  de la parabole  $(C_m)$  et montrer que lorsque  $m$  parcourt  $\mathbb{R}^*$  le point  $S_m$  décrit un ensemble  $(\Gamma)$  dont on déterminera l'équation. (0,75 pt)
3. Déterminer suivant les valeurs de  $m$ , le nombre et le signe des racines de la fonction polynôme  $f_m$ . (1,25 pt)
4. On suppose que  $f_m$  admet deux racines  $\alpha$  et  $\beta$ .
- a. Déterminer une relation entre  $\alpha$  et  $\beta$ , Indépendante de  $m$ . (0,5 pt)
- b. Calculer  $\alpha$  ;  $\beta$  et  $m$  sachant que  $\alpha + 2\beta = 4$ . (0,75 pt)
- c. Exprimer les expressions  $A$  et  $B$  suivantes en fonction de  $m$ .
- i.  $A = (\alpha - \beta)^2$ . (0,5 pt)
- ii.  $B = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ . (0,5 pt)

### **Exercice :5 (02,5 points)**

1. Calculer les limites suivantes
- a.  $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 2x}{3 - x}$ . (0,25 pt)
- b.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{x - 1}$ . (0,5 pt)
- c.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + 17x^2 - 2x - 5)$ . (0,25 pt)
- d.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^2 - 4}$ . (0,5 pt)
2. Résoudre suivant les valeurs du paramètre réel  $\alpha$  le système
- (S) :  $\begin{cases} x - \alpha y = -\alpha \\ -\alpha x + y = \alpha \end{cases}$ . (1 pt)

**\*\*\*+++BON TRAVAIL ET BON COURAGE !!!\*\*\***